

ZANGHERI P.- Flora di Ro=
magna.Funghi (Hymeniales)
(1924)

TURALE
MAGNA


ZANGHERI

ORI

10

7

P. ZANGHERI



Flora di Romagna

FUNGHI (HYMENIALES)



P. ZANGHERI

Flora di Romagna

FUNGI (HYMENIALES)



FORLÌ :: :: ::

TIP. P. VALBONESI

P. ZANGHERI

Flora di Romagna

FUNGHI (HYMENIALES)

Dopo la pubblicazione del mio lavoretto sulla flora del Circondario di Forlì (1) sono venute alla luce, per opera di vari studiosi, diverse note sui Licheni (2), sulle Briofite (3) e sui funghi microscopici (4) di questa regione, fatte su materiale da me raccolto e posseduto.

Ciò assolve in parte la promessa contenuta in calce al ricordato mio lavoro, in merito alla quale ho anche il piacere di aggiungere che altro copioso materiale è tuttora in istudio, ed io continuo sempre a raccogliere nell'intento di completare, nel miglior modo possibile, le conoscenze floristiche su questa regione romagnola, sotto tale aspetto così poco nota,

Intanto non credo inutile procedere alla pubblicazione di questo elenco di Imenomiceti, perchè comprende un numero non disprezzabile di specie e aumenta moltissimo (come si rileverà in seguito) le nostre conoscenze sulla flora micologica della Romagna.

(1) ZANGHERI P. - *La flora del Circondario di Forlì* (Nuovo Giorn. Bot. Ital. 1913).

(2) MAMELI EVA - *Contributo alla Lichenologia del forlivese* (Atti dell'Istit. Bot. d. R. Univers. di Pavia ser. III, Vol. V.).

(3) ZODDA GIUSEPPE - *Cenni sulle Briofite forlivesi* (Bollett. d. Soc. Botan. Ital. 1921).

(4) SAVELLI MARIANO - *Primo contributo alla conoscenza della flora micologica della Provincia di Forlì* (Malpighia, 1914).

*
* *

Nel mio lavoro sopracitato fissai come limiti della zona da me percorsa e investigata, i confini del Circondario di Forlì. Le escursioni e le osservazioni successive mi hanno, già da vari anni, persuaso ad abbandonare tali limiti assolutamente artificiali per cercarne altri più naturali, e quindi al mio scopo più razionali. E, come già ebbi campo di dire in un mio recente scritto di natura faunistica (1), ho esteso il campo delle mie ricerche ad una terza parte all'incirca del territorio romagnolo (2), « e precisamente a tutta la striscia che si distende dalla cresta appenninica al mare, e che ha per limiti, a nord-ovest il contrafforte settentrionale del fiume Montone e a sud-est quello meridionale del Savio. Abbraccia cioè le vallate di questi due fiumi e di quelli intermedi, allargandosi presso al mare per includere tutte le saline di Cervia e l'intera pineta di Ravenna. » Il lato nord-est viene così ad essere costituito dalla spiaggia adriatica a cominciare dalle foci del Reno fino a « la Tagliata » e quello sud-ovest corre sul crinale dell'Appennino tosco-romagnolo da Giogo Secchieta (m. 1135 s. l. m.) a M. Aquilone (m. 1355 s. l. m.) nel gruppo del M. Fumajolo.

Restano inclusi in questi limiti naturali le magnifiche abetine e faggete che si distendono sugli alti dorsali, e più giù boschi di Castagno e macchie di Quercie e di Cerri sparsi per la zona montana e collinosa, e, sulla zona littoranea le ben note pinete ravennati. Tutte stazioni di alto interesse per le ricerche micologiche, ch'io ho potuto però finora solo in parte percor-

(1) ZANGHERI P. - *Fauna di Romagna - Lepidotteri (prima contribuzione)* - (Memorie della Soc. Entomologica Ital. Volume II - Genova 1923).

(2) Per comodità del lettore ripeto anche qui i confini della regione romagnola: sono « a Sud-Ovest l'Appennino centrale, cominciando dal Monte Citerna e terminando al Monte Maggiore nell'Alpe della Luna; a Nord-Est l'Adriatico dalla foce del Reno o Po di Primaro a Fiorenzuola nel promontorio di Focara; a Sud-Est la cresta dei monti di Focara fino al Monte Maggiore indicato; a Nord-Ovest infine il Po di Primaro fino allo sbocco del Sillaro, poi questo fiume fino al Monte Taverna e di là per la cresta dei monti fino al Monte Citerna » - ROSETTI EMILIO - *Emilia e Romagna* (Bollett. d. Soc. Geografica Italiana, Vol. XXXVI, anno 1899).

rere, sia per il poco tempo a disposizione, sia per il disagiata accesso di vari luoghi.

Delle località che più frequentemente ricorrono nel corso del lavoro stimo opportuno dare qualche succinto cenno descrittivo procedendo dalla pianura alla montagna.

Le *Pinete di Ravenna* sono ora ridotte a tre, quella di Cervia la più piccola (lunga circa km. 3.5 larga in media km. 2.5) quella di Classe (lunga circa 6 km. larga in media 2) e la più grande quella di S. Vitale (lunga 10 km. circa larga da km. 1 a 2). Le meglio conservate sono quelle di Classe e di S. Vitale. Essenza principale è il Pino da pinoli (*Pinus Pinea L.*) cui s'aggiungono quercie, pioppi e un sottobosco nel quale predominano il Ginepro, il Ligustro, i Rovi, la *Phyllirea augustifolia* ecc.

In certi punti la vegetazione è folta e intricata in altri invece si aprono larghe radure e praticelli scoperti. Le escursioni da me fattevi nelle epoche propizie per le ricerche micologiche non furono molte, purtroppo, ed è quindi da attendersi da ulteriori ricerche una messe, se non copiosa, almeno discretamente buona.

Le macchie della Monda, di Ladino e di Scardavilla, sono (per quella della Monda occorre dire «era» perchè in questi ultimi anni è stata quasi completamente distrutta) costituite di Quercie *Quercus Robur L.* var. e *Quercus Cerris L.*) frammiste a Ginepri e a qualche altra essenza (Olmi, Pioppi, e nel sottobosco Rovi, *Erica arborea*, *Calluna vulgaris*, ecc.

Quella della Monda sorgeva presso Magliano, a m. 50 circa s. l. m., all'inizio delle prime colline, quella di Ladino si distende ancora, per circa 20 ettari a 80-90 m. s. l. m., sui colli della parrocchia omonima.

La macchia di Scardavilla, la meglio conservata fra tutte, cresce presso Meldola a 100 m. circa s. l. m. per una estensione di circa 12 ettari entro il recinto di un antico convento Camaldolese.

Ho esplorato ripetutamente con cura queste tre località ma non mi lusingo certamente di averne colta l'intera flora micologica.

I boschi di Castagno più spesso visitati sono quelli in parrocchia di Polenta poco a monte di Bertinoro, e altri nelle vicinanze di Predappio. Offrono la solita fisionomia dei castagneti: i primi, a circa 150 m. s. l. d. m. sono di limitatissima estensione in un ripido pendio in fondo alla valletta del torrente AUSA; i secondi, molti più estesi, si trovano a una altitudine di circa 250 m. s. l. m. Anche questi castagneti furono, specialmente quelli di Polenta, ripetutamente percorsi.

* * *

Le conoscenze nostre sugli Imenomiceti romagnoli (intendo qui parlare della Romagna intera e non della sola parte da me esplorata) sono tutt'altro che abbondanti. Giovanni Antonio Battarra è l'autore che fece conoscere il maggior numero di specie. La sua ben nota opera sui funghi del Riminese (1) contiene le descrizioni le figure di buon numero di specie raccolte nei dintorni di Rimini in gran parte identificate dai moderni micologi.

Da uno spoglio che ho cercato di fare sulla Flora Italica Cryptogama, mi risulta che le specie battarriane identificate, e spettanti alle famiglie contemplate in questo lavoro sarebbero circa 150 (2).

(1) BATTARRA G. A. - *Fungorum Agri Ariminensis historia*. Faventiae, 1755, con 40 tav.

(2) Eccole: 1. *Amanita nitida* [Fr.] Secr., 2. *A. solitaria* [Bull.] Secr., 3. *A. caesarea* [Scop.] Pers., 4. *A. cocolla* [Scop.] Gill., 5. *Lepiota inoculata* [Fr.] Sacc., 6. *L. mastoidea* [Fr.] QuéL., 7. *L. haematosperma* [Bull.] QuéL., 8. *Armillaria laqueata* [Fr.] Sacc., 9. *A. fracidia* [Fr.] Gill., 10. *A. Mori* [Paul.] Gill., 11. *A. rhagadiosa* [Fr.] QuéL., 12. *A. Mellea* [Vahl.] QuéL., 13. *A. constricta* [Fr.] Gill., 14. *A. focalis* [Fr.] Sacc., 15. *Tricholoma sculpturatum* [Fr.] QuéL., 16. *T. elythroides* [Scop.] Karst., 17. *T. murinaceum* [Bull.] Gill., 18. *T. amethystinum* [Fr.] Gill., 19. *T. malluvium* [Fr.] Sacc., 20. *T. album* [Schäff.] QuéL., 21. *Clitocybe gangraenosa* [Fr.] Gill., 22. *C. hortensis* [Pers.] Gill., 23. *C. laccata* [Scop.] QuéL., 24. *Collybia nummularia* [Lam.] Gill., 25. *C. extuberans* [Fr.] QuéL., 26. *C. longipes* [Bull.] QuéL., 27. *C. contorta* [Bull.] Karst., 28. *C. butyracea* [Bull.] QuéL., 29. *C. laxipes* [Fr.] QuéL., 30. *Mycena galopoda* [Pers.] QuéL., 31. *M. haematopoda* [Pers.] QuéL., 32. *M. denticulata* [Boît.] Turconi, 33. *M. inclinata* [Fr.] QuéL., 34. *M. galericulata* [Scop.] QuéL., v. *calopoda* Fr., 35. *Pleurotus Battarrae* QuéL., 36. *P. mutilus* [Fr.] Gill., 37. *P. Eryngii* [DC.] QuéL., var. *Cardarella* [Fr.] Sacc., 38. *P. olearius* [DC.] Gill., 39. *Hygrophorus leporinus* Fr., 40. *H. miniatus* [Scop.]

Nel 1774 Francesco Ginanni (1) nella sua opera « Istoria Civile e Naturale delle Pinete Ravennati » fece conoscere anche

Schröt., 41. *H. obrusseus* Fr., 42. *H. psittacinus* [Schäff.] Fr., 43. *Lactarius capsicoides* Fr., 44. *L. circellatus* [Batt.] Fr., 45. *L. aurantiacus* Fr., 46. *Russula delica* Fr., 47. *R. adusta* [Pers.] Fr., 48. *R. galochroa* Fr., 49. *R. Linnaei* Fr., 50. *R. pectinata* [Bull.] Fr., 51. *Cantharellus tubiformis* [Bull.] Fr., 52. *C. edulis* Pers., 53. *Marasmius lupuletorum* [Weinm.] Bres., 54. *M. languidus* [Lasch.] Fr., 55. *M. charyophylleus* [Schäff.] Schröt., 56. *M. Androsaceus* [Linn.] Fr., 57. *M. epiphyllus* [Pers.] Fr., 58. *Lentinus friabilis* Fr., 59. *L. tigrinus* [Bull.] Fr., 60. *L. contortus* Fr., 61. *L. Dunali* [DC.] Fr., 62. *Panus lithophilus* Fr., 63. *P. flabelliformis* [Schäff.] Quél., 64. *Schizophyllum alneum* [L.] Schröt., 65. *Volvaria gloeocephala* [DC.] Gill., 66. *V. pusilla* [Pers.] Quél., 67. *V. bombycina* [Pers.] Quél., 68. *Entoloma speculum* [Fr.] Quél., 69. *Clitopilus orcella* [Bull.] Quél., 70. *C. Prunulus* [Scop.] Quél., 71. *C. mundulus* [Lasch.] Gillet., 72. *Nolanea proletaria* [Fr.] Gill., 73. *N. pyramidata* [Schäff.] Sacc., 74. *Cortinarius lustratus* Fr., 75. *C. turgidus* Fr., 76. *Paxillus crassus* Fr., 77. *Pholiota praecox* [Pers.] Quél., 78. *Ph. Paxillus* [Bull.] Gill., 79. *Ph. pudica* [Bull. ? Fr.] Gill., 80. *Ph. luxurians* [Fr.] Gill., 81. *Ph. Aegerita* [Brig.] Quél., 82. *Ph. radicata* [Bull.] Quél., 83. *Ph. curvipes* [Fr.] Quél., 84. *Ph. destruens* [Brond.] Gill., 85. *Hebeloma longicaudum* [Pers.] Quél., 86. *H. fastibile* Fr., 87. *H. sinuosum* [Fr.] Quél., 88. *Inocybe dulcamara* [Alb. et Schw.] Quél., 89. *I. hiulca* [Fr.] Gill., 90. *I. sindonia* [Fr.] Karst., 91. *I. discissa* [Fr.] Quél., 92. *Flammula azyma* [Fr.] Quél., 93. *F. inopoda* [Fr.] Sacc., 94. *Naucoria porriginosa* [Fr.] Karst., 95. *N. erinacea* [Fr.] Gill., 96. *N. limbata* [Bull.] Quél., 97. *N. arvalis* [Fr.] Quél., 98. *N. vervacti* [Fr.] Quél., 99. *N. amoena* [Weinm.] Sacc., 100. *N. hyperella* [Fr.] Sacc., 101. *N. enchymosa* [Fr.], 102. *Galeria latericia* [Fr.] Quél., 103. *Agaricus campester* Linn., 104. *Stropharia Battarrae* [Fr.] Sacc., 105. *Hypholoma appendiculatum* [Bull.] Quél., 106. *H. silaceum* [Pers.] Quél., 107. *H. epixanthum* [Fr.] Quél., 108. *Anellaria fimiputris* [Bull.] Karst., 109. *Coprinus plicatilis* [Curt.] Fr., 110. *C. momentaneus* [Bull.] Sacc., 111. *C. atramentarius* [Bull.] Fr., 112. *C. cylindricus* [Schäff.] Sacc., 113. *C. porcellanus* [Schäff.] Schröt., 114. *C. micaceus* [Bull.] Fr., 115. *C. flocculosus* [DC.] Fr., 116. *Psathyrella minutula* [Schäff.] Sacc., 117. *Panaeolus Phalaenarium* [Fr.] Quél., v. *nutans* [Fr.] Sacc., 118. *P. hypomelas* [Fr.] Sacc., 119. *P. sphinctrinus* [Fr.] Quél., 120. *P. gomphodes* [Fr.] Sacc., 121. *P. acuminatus* [Schäff.] Quél., 122. *Boletus asprellus* Fr., 123. *B. rufus* Schäff., 124. *B. badius* Fr., 125. *B. stripes* Fr., 126. *B. subtomentosus* Linn., 127. *B. edulis* Bull., 128. *Polyporus laciniatus* Pers., 129. *P. leptcephalus* [Jacq.] Fr., 130. *P. tuberaster* [Jacq.] Fr., 131. *P. salignus* Fr., 132. *P. caudicinus* [Scop.] Köhl., 133. *Fomes comatus* [Weinm.] Gill., 134. *F. Gelsorum* [Fr.] Cooke, 135. *F. marginatus* [Fr.] Gill., 136. *F. fomentorius* [Linn.] Gill., 137. *Ganoderma Pseudoboletus* [Jacq.] Murril., 138. *Polystictus radiatus* [Sow.] Fr., 139. *P. versicolor* (Linn.) Fr., 140. *P. multicolor* (Schäff.) Sacc., 141. *Daedalea quercina* (Linn.) Pers., 142. *D. aurea* Fr., 143. *D. unicolor* (Bull.) Fr., 144. *Hydnum Ramaria* Fr., 145. *Thelephora intybacea* Pers., 146. *Clavaria amethystina* Bull., 147. *C. coralloides* L., 148. *C. albida* Schäff., 149. *C. pistillaris* Linn.

(1) GINANNI F. - *Istoria civile e naturale delle Pinete Ravennati*. Roma 1774.

alcuni funghi delle pinete, poco più di una cinquantina, e non tutti Imenomiceti (1).

Bisogna poi giungere al 1869 — per quanto io so — per trovare la nota di Ludovico Caldesi su la *Lenzites faventina* Cald. raccolta ai « Sabbioni » presso Faenza (2) e al 1904 per il lavoro del Cufino sui funghi raccolti dal Conte Antonio Magnaguti ove si figurano alcune specie di Imeniali del Faentino (3).

Occorrerebbe aggiungere le non numerose specie pubblicate, specialmente per opera del Caldesi, in varie « exsiccata » in ispecial modo, nell' « *Erbario crittogamico Italiano* », in « *Rabenhorst - Fungi Europaei* » e « *Roumeguère - Fungi selecti Galliae exsiccate* », e credo

(1) Pag. 313. Piante funghi. Genere I. n. 286. Agarico - *Agaricus acaulis, lamellae labyrinthi fornibus*, del Linneo (Syst. nat. 2. 1349) - *Agaricum auriculae forma*, del Turneforzio (T. 562) - *Agaricus deadalocis finibus excavatus*, del Turneforzio (T. 562) - *Agaricum exculentum, castaneae adnascens, latissimum hepatis facie, superne ex rubro ferrugineum, interne sanguineum subtus ochroleucum*, del Micheli (N. Pl. Gen. 117 T. 60) - *Agaricum squamosum membranaceum superne obscurum, et sericeum, inferne ex albo rufescens*, del Micheli (Nov. Pl. Gen. 124) - *Agaricum squamosum album, superne subhirsutum, inferne pectinatum*, del Micheli (Nov. Pl. Gen. 122) - *Agaricus stipitatus pileo infundibuliformis piloso lamellis aequalibus*, del Linneo (Syst. nat. 2. 1349) - *Agaricus varii coloris, squamosus*, del Turneforzio (T. 562). Fungo orbicolare - *Fungus orbicularis secundum vias, et in quercetis autumnonascens*, del Bauhino (C. B. P. 373 T. 560). Genere II. N. 287 Boletto, *Boletus esculentus, rugosus albicans quasi fuligine infectus*, di Turneforzio (T. 561). Fungo corvo o carbonaio - *Polyporus esculentus, parvus, et habitior, ex griseo, et obscuro nigricans, inferne albus, et tenuissime porosus, pediculo cum superno pileoli parte ejusdem coloris*, del Micheli (Nov. Pl. Gen. Tab. 70 p. 2). Genere III. N. 288. Fungo bianco - *Fungus pileolo lato, orbicularis, candicante*, di Gasparre Bauhino (C. B. P. 370 T. 557). Genere IV. N. 289. Steccherina - *Hydnum stipitatum pileo convexo, imbricato*, del Linneo (Syst. Nat. 2. 1350). Genere V. N. 290 Berettola, Trombetta di morto - *Elvela pileo deflexo adnato lobato difformi*, del Linneo (Syst. Nat. 2. 1351). Genere VI. N. 291. Pasta sciringa terrestre - *Fungoides fungiforme, pullum, crispum, et varie complicatum, pediculo tenuiori, non fistuloso*, del Micheli (Nov. Pl. Gen. 204 Tab. 86 f. 9). Genere VII. N. 212. Coralloide - *Clavaria ramis confertis ramosissimis inaequalibus*, del Linneo (Syst. Nat. 2. 1351). Genere VIII. p. 293 - *Vescica Lycoperdou stipite longo, capitulo globoso glabro: ore cylindrico integerrimo*, del Linneo (Syst. Nat. 2. 1352).

(2) CALDESI L. - *Lenzites faventina* Cald. (Nuovo Giorn. Bot. Italiano. Firenze 1869).

(3) CUFINO L. - *Fungi Magnagutiani* (Malpighia Vol. XVIII, 1904, pag. 553). Ecco le specie di Imeniali faentine - 1. *Lactarius insulsus* Fr., 2. *Cantharellus crispus* (Bull.) Fr., 3. *Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr., 4. *Fistulina hepatica* (Huds) Fr., 5. *Ganoderma lucidum* (Leys), 7. *Hydnum graveolens* Delast, 7. *Stereum hirsutum* (Willd.) Fr., 8. *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., 9. *Corticium caeruleum* (Schr.) Fr.

che si giungerebbe così a mettere insieme tutte, o *quasi tutte*, (1) le conoscenze sugli Imenomiceti romagnoli.

Non posso però passare sotto silenzio le figure a colori di funghi che sono comprese in alcune opere manoscritte di botanica del naturalista forlivese padre Cesare Majoli (2) e che si riferiscono nelle maggior parte a esemplari raccolti in Romagna.

Varie opere di questo studioso sono possedute dalla Biblioteca Comunale di Forlì, altre sono da ricercare forse in qualche privata biblioteca.

Riporto quanto ne scriveva il Bertoloni (3): «Ma chi largheggiò più di ogni altro nello studiare i nostri funghi, nel disegnarli e colorirli al naturale fu il padre Cesare Majoli di Forlì. Esso lasciò molti volumi colle tavole di questi funghi i quali volumi ora stanno nella libreria del Marchese Lovatelli di Ravenna ove io stesso li vidi. Quanto sarebbe desiderabile che quel vasto tesoro di micologia italiana fosse fatto di pubblica ragione!» E anch'io non posso fare a meno di unire la mia modesta voce a quell'augurio sperando che qualche esimio specialista possa prendere in esame quelle tavole portando così certamente un notevole contributo alla micologia romagnola ed italiana.

*
* *

L'elenco che presento comprende 327 specie e 5 varietà e precisamente 263 specie e 5 varietà di Agaricaceae, 36 Polyporaceae, 6 Hydnaceae, 11 Thelephoraceae, 10 Clavariaceae, 1 Tremellacea. Poche sono le specie già comprese nell'opera del Batarra, e nelle note del Cufino e del Caldesi. Una quarantina in

(1) E' difficile, lontano da centri di studio, approfondire le ricerche; ciò mi costringe ad adoperare questa frase nella eventualità che qualche notizia possa essermi sfuggita.

(2) Si vedano le notizie che ho dato su questo naturalista in ambedue i miei lavori sopracitati.

(3) BERTOLONI A. - *Lo stato attuale della micologia in Italia e sulla necessità di nuovi studi* (Atti 8.a Riunione Scienziati Italiani tenuta in Genova nel 1846. Genova 1847).

tutto come emergerà nell'elenco delle specie. Le altre (quasi 300) sarebbero quindi nuove per la Romagna, e il numero totale degli Imeniali finora conosciuti per questa regione salirebbero a circa 440 (1) non tenendo conto delle specie pubblicate nelle « exiccatae » che almeno per ora mi sfuggono. Dall'elenco risulta ancora che 152 specie e 1 var. (2) sono nuove per l'Emilia e di queste 19 specie e 1 var. (2) non furono finora raccolte in Italia. Tali risultati dimostrano purtroppo che le nostre conoscenze sulla micologia italiana sono ancora molto scarse e frammentarie e che una diligente e metodica esplorazione delle varie regioni aumenterebbe notevolmente il numero già cospicuo degli Imenomiceti italiani e farebbe allargare in maniera ancor più notevole il quadro della distribuzione geografica delle varie specie.

L'elenco delle località, le indicazioni dei mesi di raccolta che fan seguito a ciascuna specie si riferiscono unicamente alle mie personali osservazioni e agli esemplari da me collezionati e conservati nel mio erbario. Valendomi oltre che delle indicazioni contenute nella Fl. It. Crypt. anche di altre comunicatemi dal Bresadola, non ho poi creduto superfluo aggiungere per le specie mangereccie il segno \blacklozenge , per quelle velenose il segno \blackcross , per quelle sospette il segno \ast . Da uno spoglio risulta che 75 sono eduli, 18 velenose e 17 sospette.

Tutte le determinazioni sono dovute - ad eccezione di pochissime fatte dal Prof. G. B. Traverso, dal Prof. Voglino e da me - all'Esimo Micologo Abate Giacomo Bresadola di Trento, il quale le à eseguite quasi sempre su materiale fresco. Ciò costituisce la più valida garanzia dell'esattezza del lavoro.

(1) Sono circa 110 le specie del Battarra da me non trovate e sono essenzialmente queste che elevano a 440 circa le specie degli Imeniali romagnoli conosciuti.

Però, sebbene l'identificazione delle specie battarriane sia stata eseguita da valenti micologi (Fries ecc.) non posso fare a meno di trascrivere l'autorevole parere (in litt.) del Bresadola a questo proposito: « Le specie di Battarra adottate da Fries come nuove sono tutte dubbiose e da cancellarsi, perchè non mai trovate dopo; le specie poi già conosciute e trovate a cui Fries attribuisce le figure di Battarra sono pure approssimativamente applicate, per cui non si è sicuri che veramente esistino nell'agrominese. Se veramente esistessero Ella ne avrebbe dovuto trovare di più ».

(2) Come si vedrà dall'elenco alcune di tali specie sono dubbie.

Sento di dover porgere anche di qui allo scienziato illustre che mi ha onorato di tanto aiuto i sensi della mia sincera riconoscenza. Un grazie di cuore vada sempre anche all'amico e collaboratore Luigi Benzoni che non si stanca di essermi compagno in quasi tutte le mie escursioni.

Ha seguito integralmente nell'ordinamento delle specie e nella nomenclatura la Flora Italica Cryptogama - Pars. I - Fungi - Fasc. 14 e 15. (Hymeniales) (1). Ho aggiunto un sinonimo solamente in pochissimi casi e più precisamente dove, a giudizio anche del Bresadola, nelle Flora Italica furono adoperati nomi oggi generalmente abbandonati dai micologi. In tali casi il nome posto come sinonimo è quello più conosciuto e più adoperato nelle maggiori opere di micologia.

Le specie nuove per l'Italia e non comprese in detta flora furono poste in calce ai rispettivi generi.

Spero di colmare con elenchi successivi le lacune che non possono mancare di essere in questo.

Forlì, 30 Dicembre 1923.

(1) Rocca S. Casciano 1915-16.

ELENCO DELLE SPECIE

AGARICACEAE

SECT. I. LEUCOSPORAE

Amanita aspera Pers. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Settembre-Ottobre. ✕

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **pantherina** (DC.) Secr. - Macchia di Scardavilla; Novembre. ✕

— **mappa** (Batsch.) Pers. - Macchia di Scardavilla, boschi di castagni a Polenta; Ottobre-Novembre. ✕

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **caesarea** (Scop.) Pers. - In tutte le macchie e boschi, ma scarsa; autunno. ◆

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

Amanitopsis vaginata (Bull.) Roze = *Agaricus vaginatus* Bull. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Settembre-Ottobre. ◆

Lepiota mastoidea (Fr.) Qué. - Pineta di Classe; Settembre. ◆

Oss. Raccolta nel Riminese dal Battarra.

— **procera** (Scop.) Qué. - Macchie di Ladino, della Monda e di Scardavilla; Ottobre-Novembre. ◆

Lepiota Friesii (Lasch.) Qué. - Campi presso Forlì; Novembre. ✕

— **cristata** (Alb. et Schw.) Qué. - Pinete di Classe e di S. Vitale; Settembre-Novembre. ✕

— **helveola** Bres. var. **Barlae** Bres. - Pineta di Classe; Ottobre. (il tipo è ✕, la var. non è provato che sia tale)

Oss. - Nuova per l'Emilia.

— **clypeolaria** (Bull.) Qué. - Macchia di Scardavilla; Ottobre e Novembre. ◆

Lepiota naucina (Fr.) Quél - Pineta di Classe, macchia di Ladino ; ottobre. ◆

— var. **leucothites** Vitt. - Pineta di S. Vitale ; Settembre.

Oss. - Nuova per l'Emilia ; però secondo Bresadola non differisce da *L. naucina typ.*

Armillaria mellea (Vahl.) Quél - Alla base del tronco di vari alberi pressochè ovunque ; Settembre Novembre. ◆

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

Tricholoma sejunctum (Sow.) Quél - Macchia di Scardavilla ; Novembre ◆

Oss. - Nuova per l'Emilia.

— **coryphaeum** (Fr.) Gill. - Macchie di Ladino, della Monda e di Scardavilla ; Settembre-Novembre. *

Oss. - Nuova per l'Emilia.

— **Russula** (Schäff.) Gill. - Macchia di Ladino ; Ottobre. ◆

— **fulvum** (Bull.) Sacc. = *Tricholoma fulvellum* Fr. - Macchia di Scardavilla, boschi di castagni presso Polenta e presso Predappio ; Settembre-Novembre *

Oss. - Nuova per l'Emilia.

— **glutinosum** (Bull.) Bres. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre.

Oss. - Non nota dell'Emilia, ma solo della Lombardia e del Trentino.

— **ustale** (Fr.) Quél. - Macchia di Ladino ; Ottobre. ◆

— **Columbetta** (Fr.) Quél. - Macchia di Ladino ; Ottobre. ◆

? — **luridum** (Schäff.) Quél - Castagneti presso Predappio ; Settembre. ◆ ?

Oss. - Non nota dell'Emilia. -

— **rutilans** (Schäff.) Quél. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre. ◆

— **terreum** (Schäff.) Quél. var. **chrysites** Fr. - Macchia di Scardavilla ; Novembre. ◆

Oss. - La var. nuova per l'Italia.

— **cuneifolium** (Fr.) Gill. - Macchia della Monda ; Novembre. ◆

Oss. - Non nota dell'Emilia, ma soltanto delle Alpi Marittime e del Trentino. -

Tricholoma miculatum (Fr.) Gill. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. - Citata solo per il Piemonte con incertezza.

— **elytroides** (Scop.) Karst. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre-Novembre.

Oss. - Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

— **murinaceum** (Bull.) Gill. - Macchie della Monda e di Scardavilla; Ottobre-Novembre. ✕

— **jonides** (Bull.) Quél. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre. ◆

— **oreinum** (Fr.) Gill. - Pineta di S. Vitale; Novembre. ◆

— **acerbum** (Bull.) Quél. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre. ◆

— **brevipes** (Bull.) Quél. - Pineta di S. Vitale; Novembre. ◆

Oss. - Non nota finora dell'Emilia.

— **humile** (Pers.) Quél. - Presso Forlì; Novembre. ◆

— **melaleucum** (Pers.) Quél. - Pineta di S. Vitale, macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre-Novembre. ◆

— **sordidum** (Fr.) Quél. - Macchia di Scardavilla; Novembre. ◆

Oss. Ignota finora dell'Emilia.

Clitocybe phyllophila (Fr.) Quél. - Pineta di Classe, macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre. ✕

— **candicans** (Pers.) Quél. - Macchie di Ladino, della Monda e di Scardavilla, castagneti presso Polenta; Ottobre-Novembre. ✕

— **dealbata** (Sow.) Gill. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, castagneti presso Polenta; Ottobre. ◆

Oss. Non raccolta finora nell'Emilia.

— **odora** (Bull.) Quél. - Pineta di Classe, macchia di Scardavilla e boschi di castagno a Polenta; Ottobre-Novembre. ◆

Clitocybe tabescens (Scop.) Bresad. - Alla base dei tronchi nelle macchie della Monda, di Ladino e di Scardavilla; Settembre-Novembre. ◆

Oss. Non osservata fin ad ora nell'Emilia.

— **socialis** (Fr.) Gill. - Macchia di Scardavilla; Ottobre ◆

Oss. Raccolta in Italia solo nel Nizzardo.

? — **parilis** (Fr.) Gill. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

Oss. Questa specie, che sarebbe nuova per l'Emilia, fu raccolta in scarsissimi esemplari che non permisero una determinazione sicura.

— **trulliformis** (Fr.) Karst. - Macchia di Scardavilla; Novembre.

Oss. Non raccolta finora nell'Emilia, ma solamente nel Nizzardo e nel Trentino.

— **infundibuliformis** (Schäff) Quéf. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, comune; Settembre-Novembre. ◆

— **flaccida** (Sow.) Quéf. - Pineta di S. Vitale, macchia di Scardavilla; Settembre-Ottobre. *

? — **inversa** (Scop.) Quéf. - Boschi di castagno presso Predappio; Settembre. ◆

— **concava** (Scop.) Gill. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

— **expallens** (Pers.) Quéf. var. **trivialis** (Fr.) Sacc. - Macchia di Scardavilla; Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia. La specie è stata raccolta in Italia solo nel Nizzardo, la varietà solamente nel Trentino.

— **obsoleta** (Batsch.) Quéf. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Anche questa specie nuova per l'Emilia, e per l'Italia nota solo del Nizzardo e del Trentino.

— **laccata** (Scop.) Quéf. = *Laccaria Scopolii* Sacc. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, boschi di castagno presso Predappio: comune; Ottobre-Novembre. ◆

Oss. Raccolta in Romagna (nel Riminese) dal Battarra.

— **proxima** Boud. = *Laccaria Scopolii* Sacc. var. *proxima* Boud. - Macchia di Scardavilla; Novembre. ◆

Oss. Mai raccolta in Emilia: nota per l'Italia del Nizzardo e del Piemonte.

? **Clitocybe luscina** Fr. - Macchia di Ladino; Settembre-Ottobre.

Oss. Non è citata nella Flora Ital. Crypt. e sarebbe quindi nuova per l'Italia.

— **paropsis** Fr. - Macchia di Scardavilla; Novembre.

Oss. Come la specie precedente.

— **vermicularis** F. - Pineta di S. Vitale; Marzo.

Oss. Come le due specie precedenti.

Collybia collina (Scop.) Qué. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Settembre-Novembre. ◆

Oss. Non raccolta finora nell'Emilia.

— **xanthopoda** (Fr.) Qué. - Sui tronchi nelle pinete di Classe e di S. Vitale; Settembre-Ottobre. ◆

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **aquosa** (Bull.) Qué. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia. In Italia raccolta soltanto nel Nizzardo, Piemonte e Trentino.

— **dryophila** (Bull.) Qué. - Macchie di Scardavilla e della Monda; Settembre-Novembre. ◆

— **macroura** (Scop.) Gramberg. = *Collybia radicata* Fr. - Alla base dei tronchi a Montevicchio; Settembre. ◆

— **longipes** (Bull.) Qué. - Castagneti presso Polenta; Ottobre. ◆

Oss. Citata per il Riminese dal Battarra.

— **fusipes** (Bull.) Qué. - Macchie di Ladino e di Scardavilla e boschi di castagno presso Civitella, comune alla base dei tronchi; Settembre-Ottobre. ◆

— **butyracea** (Bull.) Qué. - Macchia di Scardavilla; Ottobre e Novembre. ◆

Oss. Ricordata dal Battarra per il Riminese.

— **velutipes** (Curt.) Qué. - Alla base dei tronchi di *Salix* presso Forlì e a Villagrappa; Dicembre. ◆

— **tuberosa** (Bull.) Qué. - Macchia di Ladino su foglie secche; Ottobre.

Oss. Per l'Italia nota solo della Liguria, del Piemonte e Trentino.

Collybia cirrata (Schum.) Quél. - Pineta di Classe e macchia di Ladino su rami e foglie secche; Ottobre.

Mycena epipterygia (Scop) Quél. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

— **stylobates** (Pers.) Quél. - Macchia di Scardavilla su foglie secche; Settembre.

— **capillaris** (Schum.) Quél. - Macchia di Ladino su foglie secche; Ottobre.

— **hiemalis** (Osbeck.) Quél. - Sulla corteccia dei lecci a Selbagnone; Dicembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **corticola** (Pers. ex part. Schum.) Quél. - Macchia di Ladino su cortecce di quercia; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **galopoda** (Pers.) Quél. - Macchie della Monda e di Ladino su ceppi di quercia; Settembre-Novembre.

Oss. Osservata nel Riminese dal Battarra.

— **rubro-marginata** (Fr.) Gill. - Pineta di S. Vitale e Bosco Monda su foglie secche; Ottobre-Novembre.

Oss. In Italia raccolta finora solo nel Trentino.

— **pura** (Pers.) Quél. - Comune nella macchia di Scardavilla; Ottobre.

— **stannea** (Fr.) Quél. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. - Per l'Italia nota solo della Toscana.

— **nigricans** Bresad. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. - Nuova per l'Emilia; nota del Trentino e della Toscana.

— **polygramma** (Bull.) Quél. - Macchie della Monda e di Scardavilla sui ceppi di quercia; Ottobre-Novembre.

— **rugosa** (Fr.) Quél. - Sui ceppi nella macchia di Scardavilla, e nei castagneti presso Polenta; Ottobre.

Oss. - Nuova per l'Emilia.

Mycena inclinata (Fr.) Quél - Macchie di Ladino, e di Scardavilla ; Ottobre.

Oss. - È citata per il Riminese dal Battarra.

— **sudora** (Fr.) Gill. - Boschi di castagno presso Polenta ; Ottobre.

Oss. - In Italia trovata solamente nel Trentino.

— **galericulata** (Scop.) Quél. - Molto frequente sui tronchi nelle macchie di Ladino, della Monda, di Scardavilla e nei castagneti presso Polenta ; Ottobre-Novembre.

— **olida** Bres. - Macchia della Monda ; Novembre.

Oss. - Finora nota soltanto nel Trentino.

? — **canescens** Weinm. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre.

Oss. - Non è citata nella Flora Ital. Crypt. e sarebbe quindi nuova per l'Italia.

? — **plumbea** Fr. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre.

Oss. - Come la specie precedente.

Omphalia scyphoides (Fr.) Quél - Pineta di Classe, macchia di Ladino ; Ottobre.

Oss. - Nuova per l'Emilia.

— **pyxidata** (Bull.) Quél - Pineta di S. Vitale ; Novembre.

— **griseo-pallida** (Desm.) Quél - Macchia di Ladino ; Ottobre.

Oss. - Nuova per l'Emilia.

— **velutina** Quél. - Macchia di Scardavilla ; Novembre.

Oss. - D'Italia, finora nota solo per il Trentino.

— **fibula** (Bull.) Quél. - Macchia di Scardavilla su quisquiglie secche ; Ottobre.

? — **speirea** (Fr.) Sacc. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre.

Oss. - Non raccolta finora in Emilia, ma, in Italia, soltanto nel Piemonte, Veneto e Trentino.

— **grisea** (Fr.) Quél - Pineta di S. Vitale ; Novembre.

Pleurotus olearius (DC.) Gill. - Su ceppi di quercia nella macchia di Ladino, su ceppi di castagno nei boschi presso Polenta ; Ottobre. ✕

Oss. - Osservata anche dal Battarra nel Riminese.

Hygrophorus chrysodon (Batsch.) Fr. - Macchia di Scardavilla ;
Novembre. ◆

— **eburneus** (Bull.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla ; Ottobre. ◆

— **rubescens** (Pers.) Sacc. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre: ◆

Oss. - Nuova per l'Emilia.

— **limacinus** (Scop.) Fr. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre. ◆

Oss. - Nuova per l'Emilia. -

— **olivaceo-albus** Fr. - Macchia di Scardavilla ; Novembre.

Oss. - Nuova per l'Emilia -

? — **fusco-albus** (Lasch.) Fr. Macchia di Ladino ; Ottobre.

— **ficoides** (Bull.) Schröt = *Hygrophorus pratensis* Pers. - Praticelli nella macchia di Scardavilla ; Novembre ◆

— **irrigatus** (Pers.) Fr. - Macchia di Ladino ; Ottobre.

Oss. In Italia raccolta solo nel Veneto e in Toscana.

— **miniatus** (Scop.) Schröt. - Macchia di Ladino ; Ottobre ✱

Oss. Già osservata nel Riminese dal Battarra.

— **unguinus** Fr. - Macchia di Ladino ; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **psittacinus** (Schäff.) Fr. - Macchia di Ladino ; Ottobre.

Oss. Notata per il Riminese dal Battarra.

— **conicus** (Scop.) Fr. - Macchie della Monda, di Ladino e di Scardavilla ; e negli erbosi a Casticciano ; Luglio-Novembre.

— **fornicatus** Fr. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre.

Oss. Non citata nella Flora Ital. Crypt.

Lactarius deliciosus (L.) Fr. - Pineta di Classe ; Novembre. ◆

— **Listeri** (Sow.) Sacc. = *Lactarius vellereus* Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla ; Ottobre. ✱

— **controversus** (Pers.) Fr. - Macchia di Ladino ; Ottobre ◆

— *Oss.* Nuova per l'Emilia.

— **avidus** Fr. - Macchia di Scardavilla ; Ottobre. ✱

Lactarius zonarius (Bull.) Fr. - Macchia di Ladino e di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta; Settembre-Novembre. ✕

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **thejogalus** (Bull.) Fr. - Nelle località della specie precedente; Settembre-Ottobre. ✕

— **azonites** (Bull.) Fr. - Macchie di Ladino e Scardavilla; Ottobre.

Oss. In Italia raccolta solo nella Lombardia e nel Trentino.

— **camphoratus** (Bull.) Fr. - Macchia di Scardavilla, boschi presso Polenta; Ottobre-Novembre. ◆

— **rubescens** (Schäff ex parte) Bres. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Nota finora solamente nel Trentino.

Russula delica Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre ◆

Oss. Raccolta nel Riminese dal Battarra.

— **olivacea** (Schäff.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre. ◆

— *Oss.* Nuova per l'Emilia.

— **alutacea** (Pers.) Fr. - Macchia di Ladino; Ottobre. ◆

— **maculata** Quél - Macchia di Ladino; ottobre *

Oss. Per l'Italia citata solo del Trentino.

— **grisea** (Pers.) Bres. - Macchia di Ladino; Settembre. ◆

— **olivascens** Fr. - Macchia di Scardavilla; ottobre. ◆

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **elegans** Bres. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, castagneti presso Polenta; Settembre-Ottobre. *

Oss. Citata per l'Italia solamente del Trentino.

— **chamaeleontina** Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre ◆

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **livescens** (Batsch.) Quél. - Macchia di Ladino; Ottobre. ✕ ?

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **veternosa** Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre. *

Oss. In Italia fu raccolta solo nel Trentino, Veneto e Piemonte.

Russula violascens (Secr.) Sacc. - Macchia di Scardavilla; Ottobre-Novembre. ✕ ?

Oss. Per l'Italia citata soltanto di Toscana e del Tirolo.

— **puellaris** Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre. ✕ ?

Oss. Raccolta finora nel Trentino.

— **fellea** Fr. - Macchia di Ladino; Settembre. ✕ ?

Oss. Citata di Toscana e del Trentino.

— **foetens** (Pers.) Fr. - Macchie di Ladino e della Monda; Ottobre-Novembre. ✕ ?

— **emetica** (Schäff. p. p.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Settembre-Ottobre. ✕

— **fragilis** (Pers.) Fr. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre. *

? — **chlora** Gillet. - Macchia di Ladino; Settembre.

Oss. Nuova per l'Italia.

Cantharellus hydrolips (Bull.) Schröt. = *Cantharellus cinereus* (Pers.) Fr. - Boschi di castagno presso Predappio; Settembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **infundibuliformis** (Scop.) Fr. - Macchia di Scardavilla, castagneti presso Polenta; Ottobre.

Oss. Non citata per l'Emilia.

— **edulis** Pers. = *Cantharellus cibarius* Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; boschi presso Polenta e presso Civitella; Luglio-Ottobre. ◆

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

Marasmius angulatus (Pers.) Berk. - Macchia di Scardavilla; Settembre.

Oss. Nota solo della Toscana e Sicilia orientale.

— **foetidus** (Sow.) Fr. - Boschi presso Predappio sui ceppi di castagno; Settembre. *

Oss. Nota solo del Veneto e del Trentino.

— **amadelpus** (Bull.) Fr. - Su steli e rametti secchi;

macchia della Monda, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre-Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

Marasmius erythropus (Pers.) Fr. - Pineta di S. Vitale; macchia di Scardavilla; Ottobre-Novembre.

— **urens** (Bull.) Fr. - Macchia di Scardavilla su foglie secche; Settembre-Ottobre. *

— **caryophylleus** (Schäff.) Schröt. - Pineta di S. Vitale, Vecchiazano, macchia di Scardavilla; Aprile e Settembre-Ottobre. ◆

Oss. Raccolto dal Battarra nel Riminese.

— **caulicinalis** (Bull.) Quéf. = *Collybia stipitaria* Fr. - Pineta di Classe, boschi di S. Savino, Ottobre e Dicembre.

— **androsaceus** (Linn.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla su foglie marcescenti; Settembre-Ottobre.

Oss. Raccolta dal Battarra nel Riminese.

— **rotula** (Scop.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta, su foglie marcescenti; Settembre-Ottobre.

— **epiphyllus** (Pers.) Fr. - Castagneti presso Polenta su quisquiglie marcescenti; Ottobre.

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

— **insiticius** Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta su foglie marcescenti; Settembre-Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **varicosus** Fr. - Pineta di Classe; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Italia.

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. - Pineta di Classe e di S. Vitale sui tronchi di pino tagliati, Colmano su pioppo, Virano su tronchi vari; Giugno e Settembre-Ottobre.

Oss. Raccolto nel Riminese dal Battarra.

Panus semipetiolatus (Schäff.) Sacc. = *Panus stypticus* (Bull.) Fr. - Macchia di Ladino su ceppi di quercia; Ottobre.

— **rudis** Fr. - Pineta di Cervia su *Pinus*; Agosto.

Lenzites variegata Fr. - Pineta di Classe, macchia della Monda, su tronchi vari; Ottobre-Novembre.

— **betulina** (Linn.) Fr. - Caminate, su ceppi di Quercia; Ottobre.

— **flaccida** (Bull.) Fr. - Macchia di Ladino, pinete di Classe e di S. Vitale, su tronchi vari; Ottobre-Novembre.

— **abietina** (Bull.) Fr. - Forlì su gelso, Casticciano su quercia, Ravaldino e Scardavilla su legni secchi; Aprile e Settembre-Dicembre.

— **trabea** (Pers.) Fr. = *Trametes trabea* (Pers.) Bres. - Romiti e Scardavilla su legni secchi; Aprile e Ottobre.

Schizophyllum alneum (L.) Schröt. - Pineta di Cervia sui pini, presso Forlì sui gelsi, Ronco e S. Varano su legni secchi; Gennaio-Dicembre.

Oss. Raccolta nel Riminese dal Battarra.

SECT. II. RHODOSPORAE

Volvaria gloeocephala (DC.) Gill. - Presso Forlì, Vecchiazano; Novembre ✕?

Oss. Raccolta nel Riminese dal Battarra.

— **pusilla** (Pers.) Qué. = *Volvaria parvula* Weinm. - Presso Forlì nei prati; Settembre.

Oss. Come la specie precedente.

Pluteus cervinus (Schäff.) Qué. - Macchia di Ladino sui ceppi di quercia; Ottobre. ◆

— **nanus** (Pers.) Qué. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **chrysophaeus** (Schäff.) Qué. - Macchia di Ladino sui ceppi di quercia; Settembre-Ottobre.

Oss. Per l'Italia nota solo del Trentino.

Entoloma lividum (Bull.) Qué. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **griseo cyaneum** (Fr.) Qué. - Macchia di Ladino; Settembre-Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia, raccolta in Italia solo nel Trentino.

Entoloma sericeum (Bull.) Quél. - Pineta di S. Vitale, macchia della Monda; Novembre. *

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **speculum** (Fr.) Quél. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Raccolta anche dal Battarra nei dintorni di Rimini.

Clitopilus Prunulus (Scop.) Quél. - Presso Predappio nei boschi di castagno; Settembre. ◆

Oss. Come la specie precedente.

Eccilia griseo-rubella (Lasch.) Quél. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. Citata solo per il Trentino e Piemonte.

Leptonia chalybaea (Pers.) Quél. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Settembre.

— **solstitialis** (Fr.) Gill. - Macchia di Ladino; Settembre-Ottobre.

Oss. Nota solo del Trentino.

— **euchlora** (Lasch.) Quél. - Presso Predappio nei boschi di castagno; Settembre.

Oss. Nota solo del Piemonte e Trentino.

Nolanea pleopodia (Bull.) Gill. - Macchie della Monda e di Scardavilla; Ottobre-Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

SECT. III - OCHROSPORAE

Cortinarius triumphaus Fr. - Castagneti presso Polenta; Ottobre.

Oss. In Italia, raccolta solo nel Trentino.

— **infractus** (Pers.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **multiformis** Fr. - Macchia di Ladino; Ottobre.

— **rapaceus** Fr. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

Oss. Per l'Italia nota solo del Trentino.

Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Novembre.

Oss. Per l'Italia nota solo del Veneto e del Trentino.

— **turbinatus** (Bull.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **fulgens** (Alb. et Schw.) Fr. - Macchia di Ladino; Ottobre.

— **subpurpureus** (Batsch.) Fr. - Macchie della Monda e di Scardavilla; Novembre.

Oss. Raccolta in Italia solamente a Vallombrosa.

— **calochrous** (Pers.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre-Novembre.

— **glaucopus** (Schäff.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **decolorans** (Pers.) Fr. - Macchie della Monda e di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre-Novembre.

Oss. Per l'Italia, nota solo del Bresciano.

— **emollitus** Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

— **crystallinus** Fr. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

— **collinitus** (Pers.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, castagneti presso Polenta; Ottobre-Novembre. ◆

— **mucosus** (Bull.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Raccolta in Italia solo nel Trentino e all'Isola del Giglio.

— **elatus** (Pers.) Sacc. - Macchia della Monda e di Scardavilla; Ottobre-Novembre.

Oss. In Italia raccolta soltanto in Toscana e nel Trentino.

— **decumbens** (Pers.) Fr. - Macchia di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

Oss. Finora, per l'Italia, nota soltanto della Lombardia.

— **proteus** (Bull.) Sacc. = *Cortinarius anomalus* Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre. ◆

Oss. Nuova per l'Emilia.

Cortinarius cotoneus Fr. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

Oss. In Italia osservata solo nel Trentino e in Toscana.

— **cinnamomeus** (Linn.) Fr. - Macchia di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre-Novembre.

Oss. Raccolta dal Magnaguti nel Faentino (V. Cufino loc. cit.).

— **torvus** Fr. - Macchia di Scardavilla; Novembre. ♦

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **hinnuleus** (Sow.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **helvolus** (Bull.) Fr. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. In Italia raccolta solo in Liguria, Piemonte e Trentino.

— **renidens** Fr. - Macchia di Scardavilla; Novembre.

Oss. Osservata solo (per l'Italia) nel Piemonte.

— **ochro-fulvescens** (Secr.) Sacc. = *Cortinarius fulvescens* Fr. - Macchia di Ladino, castagneti presso Polenta. Ottobre.

Oss. In Italia raccolta solamente nel Trentino.

— **acutus** (Pers.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. In Italia raccolta soltanto nel Piemonte.

— **saniosus** Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. In Italia raccolta solo nel Trentino.

— **decepiens** (Pers.) Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre-Novembre.

Oss. Per l'Italia questa specie è nota del Piemonte, Lombardia e Veneto.

— **cypriacus** Fr. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Italia.

— **dolabratus** Fr. - Macchie della Monda e di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre-Novembre.

Oss. Come la sp. preced.

Cortinarius imbutus Fr. - Castagneti presso Polenta; Ottobre.

Oss. Come le sp. preced.

— **Krombholzii** Fr. - Boschi presso Polenta; Ottobre.

Oss. Come le sp. preced.

— **obtusus** Fr. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, castagneti presso Polenta; Ottobre.

Oss. Come le sp. preced.

— **talus** Fr. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

Oss. Come le sp. preced.

— **vespertinus** Fr. - Macchia di Scardavilla, boschi di Castagno presso Polenta; Ottobre.

Oss. Come le sp. preced.

Gomphidius viscidus (Linn.) Fr. - Pineta di S. Vitale; Aprile e Novembre. ♦

Paxillus acheruntius (Humb.) Schröt. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

Pholiota marginata (Batsch.) Qué. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Raccolta dal Battarra nel Riminese.

— **Aegerita** (Brig.) Qué. - Forlì, Carpena, macchia di Ladino, Casticciano, Predappio, su salice e pioppo; Agosto-Dicembre. ♦

— **destruens** (Brond.) Gill. - Presso Forlì su pioppo; Ottobre. *

Oss. Raccolta dal Battarra nel Riminese.

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Qué. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre.

— **elatum** (Batsch.) Gill. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **hiemale** Bres. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Raccolta soltanto nel Trentino e nel Napoletano.

— **versipelle** (Fr.) Gill. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Oss. Conosciuta per l'Italia solamente del Trentino e della Corsica.

- Inocybe lacera** (Fr.) Quél. - Pineta di Classe; Ottobre.
Oss. In Italia raccolta soltanto nel Trentino e in Toscana.
- **scabra** (Müll.) Gill. - Presso Forlì; Aprile.
Oss. Per l'Italia nota solo del Trentino e di Malta.
- ? — **scabella** (Fr.) Quél. - Macchia di Scardavilla; Novembre.
- **flocculosa** (Berk.) Sacc. - Presso Civitella di Romagna nei boschi di castagno; Ottobre.
- **destricta** (Fr.) Quél. - Pineta di S. Vitale; Novembre.
- **corydalina** Quél. - Boschi di Castagno presso Polenta; Ottobre.
Oss. In Italia raccolta finora solo nel Trentino.
- **fastigiata** (Schäff.) Quél. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Settembre-Ottobre.
Oss. Nuova per l'Emilia.
- **asterospora** Quél. - Macchia di Ladino; Settembre.
Oss. Citata per l'Italia del Trentino, Napoletano e Corsica.
- **umbrinella** Bres. - Macchia di Ladino; Settembre.
Oss. Raccolta solo nel Trentino.
- Flammula spumosa** (Fr.) Sacc. - Selvatici lungo il f. Rabbi a S. Lorenzo, macchia di Scardavilla; Ottobre-Novembre.
- Crepidotus mollis** (Schäff.) Quél. - Macchia di Scardavilla; Settembre.
- Naucoria flava** Bres. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.
Oss. Nota soltanto del Trentino.
- **melinoides** (Bull.) Quél. - Pineta di S. Vitale, macchia di Ladino; Ottobre-Novembre.
- **semiorbicularis** (Bull.) Quél. - Pineta di S. Vitale; Aprile.
- Galera Hypni** (Batsch.) Sacc. = *Galera Hypnorum* Batsch. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.
- **Bryorum** (Pers.) Gill. - Macchie della Monda e di Scardavilla, sui muschi; Novembre.
- **tenera** (Schäff.) Quél. - Pinete di Classe e di S. Vitale, Forlì, macchia di Ladino; Aprile e Ottobre-Dicembre.

Galera sphagnorum Pers. - Macchia di Ladino, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Italia.

Tubaria pellucida (Bull.) Gill. - Romiti; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **circumsepta** (Batsch.) Sacc. - Pineta di S. Vitale, castagneti presso Polenta; Marzo e Settembre-Novembre.

Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr. - Pineta S. Vitale; Settembre.

Oss. In Italia raccolta solo nel Trentino.

SECT. IV. JANTHINOSPORAE

Agaricus comptulus Fr. - Pineta di S. Vitale; Settembre. ◆

Oss. Per l'Italia, citata del Veneto e del Trentino.

— **campester** L. = *Psalliota campestris* L. - Più o meno comune in tutto il territorio dalla primavera all'autunno. ◆

Oss. Citata anche dal Battarra pei dintorni di Rimini.

— — var. **praticola** Vitt. - Prati di Scardavilla; Ottobre-Novembre. ◆

Stropharia semiglobata (Batsch.) Qué. - Pineta di S. Vitale; Settembre-Novembre.

— **coronilla** (Bull.) Qué. - Pineta di S. Vitale, macchia di Scardavilla; Settembre-Novembre. *

Hypholoma lacrimabundum (Fr.) Qué. = *Hypholoma cotoneum* Qué. - Romiti; Ottobre. *

— **Candolleianum** (Fr.) Qué. - Presso Forlì e macchia di Scardavilla; Aprile e Novembre.

— **appendiculatum** (Bull.) Qué. - Pineta di S. Vitale; Aprile e Settembre.

Oss. Raccolta dal Battarra nel Riminese.

— **hidrophilum** (Bull.) Qué. - Macchia della Monda su ceppi di quercia; Novembre.

— **latericium** (Schäff.) Schröt. = *Hypholoma sublatericium* Sch. - Sui ceppi di quercia nelle macchie di Ladino e della Monda; Ottobre-Novembre. ✕

— **fasciculare** (Huds.) Qué. - Pinete di Classe e di S.

Vitale, macchie di Ladino e della Monda, boschi presso Polenta ecc., molto comune sui ceppi; Marzo-Aprile e Ottobre-Novembre. ✕

Psilocybe coprophila (Bull.) Quél. - Pineta di S. Vitale; Marzo.

— **nuciseda** (Fr.) Sacc. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. Nota del solo Trentino.

— **ericacea** (Pers.) Quél. - Campi presso la macchia della Monda; Ottobre-Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **semilameata** Fr. - Presso Forlì; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Italia; non citata nella Flora Italica Cryptogama.

Psathyra torpens (Fr.) Quél. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

— **fatua** (Fr.) Quél. - Macchia di Ladino; Ottobre.

SECT. V. MELANOSPORAE

Anellaria separata (Linn.) Karst. - Pinete di Classe e di S. Vitale; Settembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

Coprinus ephemerus (Bull.) Sacc. - Macchia di Ladino; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **plicatilis** (Curt.) Fr. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

Oss. Osservata anche dal Battarra nei dintorni di Rimini.

— **stercorarius** (Bull.) Fr. - Campi presso la macchia della Monda sul letame; Ottobre-Novembre.

— **atramentarius** (Bull.) Fr. - Orti di Forlì e dei Romiti; Ottobre.

Oss. Ricordata anche dal Battarra per il Riminese.

— **porcellanus** (Schäff.) Schröt. = *Coprinnus comatus* Fr. - Pineta di S. Vitale, dintorni di Forlì; Ottobre-Novembre.

Oss. Notata anche dal Battarra per il Riminese.

— **deliquescens** (Bull.) Fr. - Macchia di Scardavilla; Ottobre.

Coprinus truncorum (Bull.) Fr. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **micaceus** (Bull.) Fr. - Romiti; Ottobre.

Oss. Citata dal Battarra per il Riminese.

— **niveus** (Pers.) Fr. - Pineta di S. Vitale su fimo equino; Novembre.

Psathyrella prona (Fr.) Gill. - Pineta di S. Vitale; Aprile.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **minutula** (Schäff.) Sacc. = *Psathyrella disseminata* Pers. - Macchia di Ladino al piede delle quercie; Ottobre.

Oss. Ricordata anche dal Battarra per il Riminese.

— **atomata** (Fr.) Quéf. - Pineta di S. Vitale, boschi di castagno presso Polenta; Settembre-Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **gracilis** (Pers. e. p. Fr.) Quéf. - Pineta di Classe; Ottobre.

— **subatrata** (Batsch.) Gill. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

Panaeolus carbonarius (Batsch.) Sacc. - Pineta di S. Vitale; Aprile.

— **campanulatus** (L.) Quéf. - Pineta di S. Vitale, macchia di Scardavilla; Aprile e Settembre-Ottobre.

— **varius** (Bolt.) Sacc. - Pineta di S. Vitale; Novembre.

POLYPORACEAE

Boletus cruentus Venturi = *Boletus sanguineus* With. var. *gentilis* Quéf. - Boschi di castagno presso Predappio; Settembre. ♦

Oss. Raccolta soltanto in Lombardia e nel Trentino.

— **Bellini** Inz. - Pineta di Classe; Settembre ♦

Oss. Nota solo di Sicilia.

— **chrysenteron** Bull. - Macchie di Ladino e di Scardavilla; Settembre- Ottobre. ♦

Boletus subtomentosus Linn. - Macchia di Ladino, Virano nei selvatici lungo il f. Montone; Ottobre ♦

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

— **edulis** Bull. - Macchia di Ladino e di Scardavilla; Settembre-Ottobre. ♦

Oss. Come la specie precedente.

Fistulina hepatica (Shäff.) Fr. - Boschi di castagno presso Polenta, Predappio sul castagno, Collina di Civitella su gelso; Settembre-Ottobre. ♦

Oss. Raccolta anche dal Magnaguti nel Faentino. (V. Cufino loc. cit.)

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - Presso Forlì su gelso; Ottobre.

— **biennis** (Bull.) Fr. - Macchia di Ladino su ceppi di quercia; Settembre-Ottobre.

— **flabelliformis** (Schäff.) Sacc. = *Polyporus cristatus* Pers. - Presso Polenta nei boschi di castagno; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **imberbis** (Bull.) Fr. - Romiti su pioppo; Dicembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **caudicinus** (Scop.) Köhl. = *Polyporus sulphureus* (Bull.) Fr. - Casticciano su palo telegrafico; Novembre.

Oss. Raccolta nel Riminese dal Battarra.

— **crispus** (Pers.) Fr. = *Polyporus adustus* Willd. var. *crispus* Pers. - Collina di Civitella su legno secco; Novembre.

— **adustus** (Willd.) Fr. - Macchie di Ladino, della Mon- da e di Scardavilla sulle quercie; Ottobre-Novembre.

— **spumeus** (Sow.) Fr. - Presso Forlì su pioppo; Dicembre.

— **cuticularis** (Bull.) Fr. - Macchia di Scardavilla sulle quercie; Ottobre.

— **hispidus** (Bull.) Fr. - Dintorni di Forlì, Bertinoro, Collina di Civitella sempre sul gelso; Marzo e Settembre-Ottobre.

Fomes annosus (Fr.) Cooke - Monte Ajola su abete; Luglio.

Oss. Nuova per l'Emilia.

Fomes ulmarius (Sow.) Gill. - Presso Forlì su olmo; Settembre.

— **rubriporus** Qué! - Buggiana su castagno; Settembre.
Oss. Nuova per l'Emilia.

— **fulvus** (Scop.) - Gill. Dintorni di Forlì, Romiti, Vecchiazano, Casticciano, Collina di Civitella, comune su pesco, gelso, ecc.; Gennaio-Dicembre.

— **igniarius** (Linn.) Gill. - Villagrappa, Virano su tronchi secchi; Ottobre.

— **Ribis** (Schum.) Gill. - Pineta di S. Vitale; Settembre.

— **fomentarius** (Linn.) Gill. - Montemaggiore di Predappio; Novembre.

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

Ganoderma Pseudoboletus (Jacq.) Murril. - Macchia di Ladino su ceppi di Quercia; Ottobre.

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese e dal Magnaguti nel Faentino (v. Cufino loc. cit.).

Polystictus versilor (Linn.) Fr. - Pinete di Ravenna, Forlì, Vecchiazano, macchia di Ladino, macchia della Monda, Monte Poggiolo, Caminate, Predappio su ceppi di piante diverse e legni secchi, comunissimo. Tutto l'anno.

— **fuscatus** (Fr.) Cooke - Macchia di Ladino su le querce; Settembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **hirsutus** (Wulf.) Fr. - Pineta di Classe; Ottobre.

— **multicolor** (Schäff.) Sacc. = *Polyporus zonatus* Fr. Pineta di S. Vitale su legno secco; Marzo.

Oss. Raccolta anche dal Battarra nel Riminese.

? — **velutinus** (Fr.) Cooke - Pineta di S. Vitale su pino; Giugno.

Poria ambigua Bres. - Macchia di Ladino su ceppi di quercia, Ravaldino su legno secco. Settembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **medulla-panis** (Jacq.) Pers. - Romiti su mandorlo.

— **calcea** (Fr.) Cooke - Pineta di S. Vitale; Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

Trametes flavescens Bres. - Pineta di S. Vitale su pino; Giugno.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **lutescens** (Pers.) Bres. = *Trametes hispida* Bagl. - Pineta di S. Vitale, Forlì, Romiti, S. Varano, Virano, Casticciano, Collina di Civitella su legno secco, tronchi diversi comune; tutto l'anno.

— **Pini** (Thone) Fr. - Pineta di Classe sui pini; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

Daedalea unicolor (Bull.) Fr. - Macchia di Scardavilla, Casticciano, Ricò, Collina di Civitella quasi sempre sulle querce; Gennaio-Aprile e Settembre-Ottobre.

Oss. Raccolta anche nel Riminese dal Battarra.

HYDNACEAE

Hydnum squamosum Schöff. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre. ♦

— **amicum** Quéf. - Località della specie precedente; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **repandum** Linn. - Macchie di Ladino e di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre-Novembre.

— **zonatum** Batsch. - Nei boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

Irpex heterodom Sacc. = (sec. Bres.) *Irpex pachyodon* (Pers.) Quéf. - Nelle macchie della Monda, di Ladino e di Scardavilla sui ceppi di quercia; Ottobre-Novembre.

Oss. Nota soltanto del Trentino.

— **lacteus** Fr. - Presso Forlì su salice; Febbraio.

Oss. Nuova per l'Emilia.

THELEPHORACEAE.

Craterellus cornucopioides (Linn.) Pers. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.

Craterellus crispus (Bull.) Fr. - Castagneto presso Polenta: Ottobre.

Thelephora fastidiosa (Pers.) Fr. - Nella località delle due specie precedenti su foglie secche marcescenti; Ottobre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

Stereum gausapatum Fr. - Macchie di Ladino, della Monda, e di Scardavilla, Casticciano sulle quercie; Aprile e Ottobre-Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

— **purpureum** Pers. - Presso Forlì, Romiti, Colmano, Casticciano su quercia, pioppo, salice e robinia; quasi tutto l'anno.

— **lilacinum** (Batsch.) Pers. - Colmano su pero; Gennaio.

— **spadiceum** Fr. - Presso Forlì su legno fradicio, Casticciano su quercia; Aprile.

Oss. Non ancora raccolto nella regione emiliana.

— **reflexum** (Bull.) Sacc. = *Stereum hirsutum* Willd. - Presso Forlì, Vecchiuzzano, macchie di Ladino, della Monda, di Scardavilla, boschi presso Polenta e Predappio, a Buggiana, Seguno, comunissima su castagno, quercia, legni secchi ecc.; tutto l'anno.

Oss. Raccolta anche dal Magnaguti nel Faentino (v. Cuffino loc. cit.).

— **ochroleucum** Fr. - Macchia di Ladino sulle quercie; Ottobre.

? **Corticium roseum** Pers. - Presso Forlì su rami secchi: Dicembre.

Coniophora laxa (Fr.) Quéf - Presso Forlì su legno fradicio; Novembre.

Oss. Nuova per l'Emilia.

CLAVARIACEAE

Clavaria flava Schäff. - Macchia di Ladino; Ottobre. ◆

— **muscoides** L. - Macchia di Scardavilla; Ottobre-Novembre.

- Clavaria cinerea** Bull. - Macchia di Scardavilla, boschi di castagno presso Polenta; Ottobre-Novembre.
- **fennica** Karst. - Castagneti presso Predappio; Settembre.
Oss. Nota solo del Trentino.
- **Strasseri** Bres. - Boschi di castagno presso Polenta e presso Predappio; Settembre-Ottobre. ◆
Oss. Raccolta soltanto nel Trentino.
- **cylindrica** Bull. - Macchia di Ladino; Ottobre. ◆
- **falcata** Pers. - Boschi di castagno presso Polenta; Ottobre.
Oss. Nuova per l'Emilia.
- **pistillaris** Linn. - Macchie della Monda, di Ladino e Scardavilla; Ottobre-Novembre. ◆
Oss. Raccolta nel Riminese dal Battarra.
- **canaliculata** Fr. - Macchia di Ladino; Settembre.
Oss. Manca nella Flora Ital. Crypt. Sarebbe quindi nuova per l'Italia.
- **geoglossoides** Boud. et Pat. - Macchie di Ladino e della Monda; Ottobre-Novembre.
Oss. Come la specie precedente.

TREMELLACEAE.

- Auricularia mesenterica** (Dicks.) Fr. - Presso Forlì su tronchi secchi; Ottobre.

STORIA
DELLA

MUSEO

LAV